

Inégalités de Markov tangentielles locales sur les courbes algébriques singulières de $\mathbb{R}^n$

*version révisée**

par

LAURENT GENDRE

Abstract- We prove that all real singular algebraic curves admits Markov's local tangential inequalities. We give a geometric significance of Markov's exponent.

1 Introduction

Ce sont dans les articles de L.BOS, P.MILMAN, N.LEVENBERG et B.A. TAYLOR [14] et W. PLESNIAK et M. BARAN [11] qu'il est montré que l'exposant de Markov est au moins égal à 1 sur les surfaces algébriques de $\mathbb{R}^n$, lisses C^∞ , sans bord et compactes. Pour y parvenir, les auteurs utilisent essentiellement des outils de la théorie du pluripotentiel complexe. En revanche dans l'article R. NARASIMHAN et C. FEFFERMAN [16], il est démontré qu'il existe de telles inégalités avec un exposant de Markov valant 2 dans des compacts, ne contenant pas de points singuliers, inclus dans des sous-ensembles algébriques de $\mathbb{C}^n$, et ceci par des techniques non triviales de géométrie analytique. Bien sûr, dans cette introduction trop courte, on ne pourra citer toutes les parutions et les auteurs ayant contribué à l'essor de ce sujet vu la densité de résultats. Ceci dit, donnons une liste non exhaustive des résultats intéressants et fondamentaux de ce domaine qui permettra de cerner l'ensemble : [18], [19], [9], [10], [14], [7], [1] et [3].

Dans cet article, nous démontrons l'existence d'inégalités de Markov locales tangentielles sur les courbes algébriques singulières de $\mathbb{R}^n$. Nous répondons sur le comportement de l'exposant de Markov, en montrant qu'il est minoré par un invariant géométrique. Pour cela, nous utilisons des outils de géométrie analytique et des résultats de la théorie du pluripotentiel complexe, afin d'affaiblir la notion d'*HCP* pour la fonction de Green avec pôle

*Prépublication n°109 (1997) Laboratoire E.PICARD C.N.R.S. U.M.R. 5580

à l'infini.

2 Énoncé des Théorèmes

Nous adopterons l'identification suivante $\mathbb{C}^n \equiv \mathbb{R}^n \oplus i\mathbb{R}^n$; $\mathbb{R}^n$ est donc un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^n$. Par conséquent, nous considérons, canoniquement, $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ comme sous-espace de $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]$.

Si E est un sous-ensemble de $\mathbb{C}^n$ et a un point de $\bar{E}$, on dira que v est un vecteur tangent en a de E , s'il existe une suite $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de point de E et une suite de réels strictement positifs $(\lambda_j)_{j \in \mathbb{N}}$ telles que $v = \lim_{j \rightarrow +\infty} \lambda_j(a - a_j)$. Nous appellerons l'ensemble des vecteurs tangents de E en a le cône tangent en de E en a et le noterons $C(E, a)$. Notons que pour tout $v \in C(E, a)$, $\lambda \cdot v \in C(E, a)$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}_*^+$; les vecteurs tangents *unitaires* de $C(E, a)$ ont un sens.

Pour tout sous-ensemble $K \subset \subset \mathbb{C}^n$, nous noterons la norme uniforme sur K ainsi : $\|\cdot\|_K$.

Nous appellerons *morceau de courbe algébrique*, tout sous-ensemble analytique connexe et irréductible d'une courbe algébrique. Nous conviendrons de la notation suivante : $\mathbb{C}_i = \mathbb{C}^i \times \{0\}$ sous-espace de $\mathbb{C}^i \times \mathbb{C}^{n-i}$. Enfin pour tout sous-ensemble algébrique A de $\mathbb{R}^n$, nous noterons respectivement l'ensemble des points singuliers et réguliers par A_{sing} et A_{reg} .

Théorème 1 *Soit A un morceau de courbe algébrique. Pour tout x_0 dans A , il existe C_1, C_2 et ε_0 des constantes strictement positives, dépendant de x_0 et localement majorées telles que $\forall \varepsilon \in [0, \varepsilon_0[$, $\forall p \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$:*

1. *si $x_0 \in A_{sing}$,*

$$|D_v p(x_0)| \leq C_1 \left(\frac{C_2 (\deg(p))^2}{\varepsilon} \right)^k \|p\|_{A \cap B(x_0, \varepsilon^k)},$$

où k est la multiplicité complexe du point singulier x_0 dans $\tilde{A}$ et v un vecteur unitaire dans $C(A, x_0)$.

2. *si $x_0 \in A_{reg} \setminus \partial A$,*

$$|D_v p(x_0)| \leq C_1 \left(\frac{C_2 \deg(p)}{\varepsilon} \right) \|p\|_{A \cap B(x_0, \varepsilon)},$$

3. *si $x_0 \in \partial A \setminus A_{sing}$,*

$$|D_v p(x_0)| \leq C_1 \left(\frac{C_2 \deg(p)}{\varepsilon} \right)^2 \|p\|_{A \cap B(x_0, \varepsilon)},$$

où v est un vecteur unitaire de l'espace tangent $T_{x_0} A_{reg}$.

Corollaire 1 *Soit A une courbe algébrique, compact, localement irréductible et sans singularité au bord. Alors A admet des inégalités de Markov tangentielles locales. Il existe donc C_1, C_2 et ε_0 des constantes absolues strictement positives telles que : $\forall \varepsilon \in [0, \varepsilon_0[, \forall x_0 \in A, \forall p \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$,*

$$|D_v p(x_0)| \leq C_1 \left(\frac{C_2 (\deg(p))^2}{\varepsilon} \right)^k \|p\|_{A \cap B(x_0, \varepsilon^k)},$$

où k est la multiplicité complexe du point x_0 et v un vecteur unitaire dans $C(A, x_0)$.

Au 2 du théorème 1, nous retrouvons le résultat énoncé par Fefferman et Narasimhan dans [16], pour le cas d'une courbe algébrique. Les hypothèses du théorème 1 englobent, bien sûr, les courbes algébriques lisses sans bord. Nous en déduisons le corollaire suivant qui est une conséquence du théorème de Bos, Milman, Levenberg et Taylor [14].

Corollaire 2 *Soit A une courbe algébrique $\mathcal{C}^\infty$, compacte et localement irréductible de $\mathbb{R}^n$. A admet des inégalités de Markov tangentielles locales d'exposant 1. Autrement dit, il existe C_1, C_2 et ε_0 des constantes positives absolues telles que : $\forall \varepsilon \in [0, \varepsilon_0[, \forall x_0 \in A, \forall p \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$,*

$$|D_v p(x_0)| \leq C_1 \left(\frac{C_2 \deg(p)}{\varepsilon} \right) \|p\|_{A \cap B(x_0, \varepsilon)},$$

où v est un vecteur unitaire de l'espace tangent $T_{x_0} A$.

3 Préliminaires

3.1 Sous-ensembles algébriques de $\mathbb{R}^n$

Si S est une partie de $K^n (n \geq 2)$ (K est le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), on notera que

$$I^K(S) := \{p \in K[x_1, \dots, x_n] : p|_S = 0\},$$

est un idéal de K^n ayant un nombre fini de générateur ($K[x_1, \dots, x_n]$ est un anneau Noetherien). Si $\mathcal{P}$ est une partie non vide $K[x_1, \dots, x_n]$, on écrira

$$loc \mathcal{P} = \{x \in K^n : \forall p \in \mathcal{P}, p(x) = 0\}$$

le locus de $\mathcal{P}$.

Les sous-ensembles algébriques de K^n sont les parties A de K^n telles que :

$$loc I^K(A) = A.$$

En gardant l'identification $\mathbb{C}^n \equiv \mathbb{R}^n \oplus i\mathbb{R}^n$, nous considérerons, pour tout sous-ensemble algébrique A de $\mathbb{R}^n$ le complexifié de A comme étant le plus petit sous-ensemble algébrique complexe de $\mathbb{C}^n$ contenant A . On le notera $\tilde{A}$, ainsi que, $\tilde{A}_{reg}$ et $\tilde{A}_{sing}$ les sous-ensembles, respectifs, singuliers et réguliers de $\tilde{A}$. On remarquera que $I^{\mathbb{C}}(\tilde{A}) = I^{\mathbb{R}}(A) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ et $A = \tilde{A} \cap \mathbb{R}^n$. Pour plus de précisions, il faut se référer au livre de Narasimhan([15], page 91).

Un sous-ensemble A de $\mathbb{R}^n$ est une courbe algébrique, s'il existe des polynômes $p_1, \dots, p_s$ dans $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$, ($s \in \mathbb{N}^*$), tels que : $A = \{x \in \mathbb{R}^n : p_1(x) = \dots = p_s(x) = 0\}$ et que $\dim_{\mathbb{R}} A = 1$.

3.2 Critère d'algébricité

Le critère d'algébricité de Rudin sera utile dans la démonstration du théorème 1. Une seule implication nous servira. On trouvera sa démonstration dans([4], Théorème 3, page 78), voici son énoncé :

Théorème 2 *Soit X un sous-ensemble analytique de $\mathbb{C}^n$ ($n \in \mathbb{N}$) de dimension pure p . Alors X est algébrique si et seulement s'il existe C et s deux constantes strictement positives et un changement de coordonnées unitaire tels que :*

$$\forall z = (z', z'') \quad |z''| \leq C(1 + |z'|^s)$$

où

$$z' = (z_1, \dots, z_p) \text{ et } z'' = (z_{p+1}, \dots, z_n)$$

Nous verrons plus tard que nous choisirons un changement de coordonnées unitaire bien spécifique et que ce choix est crucial dans l'obtention de nos estimations. En effet, nous aurons besoin que le sous-espace $\mathbb{R}^n$ de $\mathbb{C}^n$ soit stable par ce changement de coordonnées. En fait, choisir un cône, comme au théorème ci-dessus, c'est trouver une "bonne" projection. Ceci peut être énoncé par la proposition suivante.

Proposition 1 *Soit $\tilde{A}$ un sous-ensemble algébrique de $\mathbb{C}^n$ de dimension pure p . Si la projection $\pi : \tilde{A} \longrightarrow \mathbb{C}_p$ est propre on a :*

$$\tilde{A} \subset \{(\xi', \xi'') \in \mathbb{C}^n : |\xi''| \leq C(1 + |\xi'|^s)\}.$$

Avec

$$\xi' = (\xi_1, \dots, \xi_p) \text{ et } \xi'' = (\xi_{p+1}, \dots, \xi_n)$$

où C et s sont des constantes strictement positives dépendant seulement de $\tilde{A}$.

Nous nous bornerons juste à énoncer ce théorème dont la démonstration figure dans ([17], Proposition 1, page 389).

3.3 Multiplicité d'un point dans les sous-ensembles analytiques

La multiplicité d'un point dans un sous-ensemble algébrique complexe de dimension pure p est donné par l'expression suivante :

$$\forall a \in \tilde{A}, \quad \mu_a(\tilde{A}) := \min \{ \mu_a(\pi_L|_{\tilde{A}}) : L \in Gr_{\mathbb{C}}(n, n-p) \}.$$

où $Gr_{\mathbb{C}}(n, n-p)$ est la Grassmannienne dans $\mathbb{C}^n$ et π_L est la projection orthogonale définie par $\pi_L : \mathbb{C}^n \simeq L \oplus L^\perp \longrightarrow L^\perp$. On a toujours $\mu_a(\tilde{A}) \geq 1$, pour tout $a \in \tilde{A}$. La multiplicité complexe $\mu_a(\tilde{A})$ n'est autre que le nombre de Lelong du courant $[\tilde{A}]$ en a ; c'est donc un invariant par biholomorphisme, cf ([4], Proposition 2, page 120 et page 190).

3.4 Paramétrisation de Puiseux pour une courbe analytique complexe

Construisons la paramétrisation de Puiseux pour les courbes analytiques de $\mathbb{C}^n$. Nous adapterons la démonstration de ([4], page 67).

Dans cette partie A est un sous-ensemble analytique de $\mathbb{R}^n$ de dimension pure 1, localement irréductible et $\tilde{A}$ le sous-ensemble algébrique complexifié de A dans $\mathbb{C}^n$, tel que $0 \in A_{sing}$ (donc $0 \in \tilde{A}_{sing}$) ; la projection $\pi : \tilde{A} \cap U \longrightarrow U' \subset \mathbb{C}_1$ ($U = U' \times U'' \subset \mathbb{C} \times \mathbb{C}^{n-1}$ un polydisque) est propre.

Pour toute fonction holomorphe f au voisinage d'un point a de $\mathbb{C}$ nous écrirons l'ordre de f en a : $ord_a f$.

Nous noterons l'ensemble $\mathcal{R}^{<r>}$, pour tout suite d'entiers $0 \leq l_1 < \dots < l_r \leq k-1$ $k \in \mathbb{N}^*$ et $r \in \mathbb{N}^*$ tel que $1 \leq r \leq k$, ainsi :

$$\mathcal{R}^{<r>} = \bigcup_{1 \leq j \leq r} \left[0, e^{i \frac{2\pi l_j}{k}} \right]$$

Proposition 2 *Sous les hypothèses et les notations décrites ci-dessus, il existe $\varphi : \overline{D(0,1)} \longrightarrow \tilde{A} \cap U$ une paramétrisation de Puiseux définie dans un voisinage ouvert du disque unité fermé $\overline{D(0,1)}$ de $\mathbb{C}_1$ telle que $\varphi(z) = (cz^k, \psi_1(z), \dots, \psi_n(z))$, $\forall z \in \overline{D(0,1)}$, où $k = \mu_0(\tilde{A})$, les ψ_j sont holomorphes avec $ord_0 \psi_j > k$ et $c \in \mathbb{C}$ constante dépendant de φ ; il existe des entiers $0 \leq l_1 < \dots < l_{r_A^+} \leq k-1$ (resp. $0 \leq l'_1 < \dots < l'_{r_A^-} \leq k-1$), où r_A^+ (resp. r_A^-) est le nombre de branche de la courbe réelle A dans U , ayant 0 comme extrémité, au dessus de $[0,1] \subset \overline{D(0,1)}$ (resp. au dessus de $[-1,0] \subset \overline{D(0,1)}$), de sorte que $\varphi|_{\mathcal{R}^{<r_A^+>}}$ (resp. $\varphi|_{\mathcal{R}^{<r_A^->}}$) paramétrise $A \cap U \cap \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n : \Re(z_1) \in [0,1]\}$ (resp. $A \cap U \cap \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n : \Re(z_1) \in [-1,0]\}$)*

Preuve : $\tilde{A}$ est de dimension complexe 1, $\tilde{A}_{sing}$ est un ensemble discret. Donc il existe un polydisque $U = U' \times U'' \subset \mathbb{C} \times \mathbb{C}^{n-1}$ tel que $\pi^{<-1>}(0) \cap \tilde{A} \cap U = \{0\}$, où π est la projection. Nous avons supposé que le sous-ensemble algébrique A est localement irréductible ; il s'en suit donc que le complexifié $\tilde{A}$ est localement irréductible, ceci d'après ([15], Proposition 2, page 92). La projection $\pi|_U$ est propre, d'après le théorème de structure des sous-ensembles analytiques complexes $(\tilde{A} \cap U, \pi, U')$ est un l -revêtement holomorphe ramifié. Fixons un point $a \in A \cap U$ tel que $a_1 \in \mathbb{R}$ où $a_1 = \pi(a)$. Soit $\gamma : [0, r_1[\rightarrow \tilde{A}$ le relèvement du segment $[0, r_1[\subset \mathbb{C}_1$ passant par a dans A (i.e $\exists t_0 \in [0, r_1[, \gamma(t_0) = a, \forall t \in [0, r_1[, \pi \circ \gamma(t) = t$). Ce relèvement existe car $(\tilde{A} \cap U, \pi, U')$ est un l -revêtement holomorphe ramifié. Comme $\tilde{A} \cap U$ est irréductible $\tilde{A} \cap U \setminus \{0\}$ est connexe. Ceci nous permet de dire que $\Gamma_r = \pi^{<-1>}(\{z \in \mathbb{C} : |z_1| = r\}) \cap \tilde{A}, \forall r \in [0, r_1[$, est une courbe de Jordan fermée. Donc le triplet $(\Gamma_r, \pi, |z_1| = r)$ est un l -revêtement. On peut ainsi construire une unique paramétrisation $\gamma_r : [0, 2\pi[\rightarrow \Gamma_r$ telle que $\pi \circ \gamma_r(t) = re^{ikt}$, avec $\gamma_r(0) = \gamma(r)$. Définissons donc :

$$\zeta(z) := \left(\frac{\pi(z)}{r_1} \right)^{\frac{1}{k}}, \quad \zeta(\gamma_r(t)) = \left(\frac{r}{r_1} \right)^{\frac{1}{k}} e^{it}.$$

La fonction ζ est holomorphe et injective sur $(\tilde{A} \cap U) \setminus \{0\}$. Donc d'après le théorème de prolongement de Riemann des fonctions holomorphes sur les singularités, la fonction $z : D(0, 1) \rightarrow \tilde{A} \cap U$, telle que $\zeta \mapsto z(\zeta)$ est une injection holomorphe. Ainsi nous obtenons une paramétrisation de Puiseux pour $0 \in \tilde{A}_{sing}$. Comme le point a n'est pas dans $\pi(\tilde{A}_{sing})$, on a donc $\{a^0, \dots, a^{k-1}\} = \pi^{<-1>}(\{a_1\}) \cap \tilde{A} \cap U$, en prenant par exemple $a = a^0$. D'après la construction de la fonction $z(\zeta)$, nous pouvons ordonner les points $(a^l)_{l \in \{0, \dots, k-1\}}$, de sorte que $\zeta(a^l) \in [0, e^{i\frac{2\pi l}{k}}]$, $\forall l \in \{0, \dots, k-1\}$. Définissons les ensembles ci-dessous :

$$\mathcal{E}^{<k>} := \bigcup_{0 \leq l \leq k-1} \left[0, e^{i\frac{2\pi l}{k}} \right].$$

et $\mathcal{R}^{<k>}$ la partie de $\mathcal{E}^{<k>}$ telle que

$$\mathcal{R}^{<r_A^+>} := \bigcup_{1 \leq j \leq r_A^+} \left[0, e^{i\frac{2\pi l_j}{k}} \right], \quad (1)$$

où r_A^+ est le nombre de branches, ayant pour extrémité 0, dans $A \cap U$ et $[0, e^{i\frac{2\pi l_j}{k}}]$ est un segment paramétrisant une branche de $A \cap U$ au-dessus du segment $[0, 1]$. Bien sûr, l'entier naturel r_A^+ ne peut dépasser k et est toujours

plus grand que 1. Ainsi $\varphi|_{\mathcal{R}^{<r_A^+>}}$ paramétrise analytiquement la partie de la courbe réelle A au-dessus du segment $[0, 1]$. Pour les branches de $A \cap U$ au-dessus de $[-1, 0]$, on se ramène au cas des branches au dessus de $[0, 1]$ par une rotation d'angle π . ■

Si v est un vecteur tangent dans $C(A, 0)$. Toutes les branches d'extrémité 0 de la courbe $A \cap U$ sont paramétrisées localement en 0 par $\varphi|_{\mathcal{R}^{<r_A^+>}}$ ou $\varphi|_{\mathcal{R}^{<r_A^->}}$. Donc pour le vecteur tangent v , il correspondra une branche de $A \cap U$, à laquelle il est tangent, et donc un segment de $\mathcal{R}^{<r_A^+>}$ et $\mathcal{R}^{<r_A^->}$, du type $[0, e^{i\frac{2\pi l}{k}}]$ paramétrisant la dite branche par $\varphi|_{[0, e^{i\frac{2\pi l}{k}}]}$. Bien sûr, la

géométrie de $\mathcal{R}^{<r_A^+>}$ et de $\mathcal{R}^{<r_A^->}$ dépendent de la nature de la singularité de la courbe algébrique réelle A .

Lemme 1 *Soit $\tilde{A}$ une courbe algébrique de $\mathbb{C}^n$ irréductible et $a \in \tilde{A}_{sing}$. Si k est l'exposant de la paramétrisation de Puiseux, alors k est aussi la multiplicité de la singularité complexe de $\tilde{A}$ en a .*

Preuve : Définissons le produit scalaire usuel dans $\mathbb{C}^n : \forall (u, v) \in (\mathbb{C}^n)^2$ avec $u = (u_1, \dots, u_n)$ et $v = (v_1, \dots, v_n)$

$$(u|v) := \sum_{j=1}^{j=n} u_j \bar{v}_j.$$

Soient $L \in Gr_{\mathbb{C}}(n-1, n)$, $u \in L^\perp$ et $v^2, \dots, v^n \in L$ tel que $(u, v^2, \dots, v^n)$ soit une base $\mathbb{C}$ -orthonormée. On a bien :

$$\mathbb{C}u \oplus \left(\bigoplus_{2 \leq j \leq n}^\perp \mathbb{C}v^j \right) = \mathbb{C}^n,$$

on en déduit donc que :

$$\forall z \in \mathbb{C}^n, \quad \pi_L(z) = (z|u)u, \quad \pi_L : L \oplus L^\perp \longrightarrow L^\perp.$$

On peut supposer que $a = 0$, sans perdre de généralité. Soit la paramétrisation de Puiseux de $\tilde{A}$ en 0, $z(\xi) = (c\xi^k, \psi_2(\xi), \dots, \psi_n(\xi))$, où les ψ_j sont holomorphes dans $D(0, 1)$ telles que $ord_0(\psi_j) > k$, $\forall j \in \{2, \dots, n\}$. Dans ([4], Lemme 1, page 107), nous avons l'égalité suivante :

$$ord_0(\pi_L \circ z(\xi)) = \mu_0(\pi_L|_{\tilde{A}}).$$

En identifiant $\mathbb{C}u$ à $\mathbb{C}$, on a

$$\pi \circ z(\xi) = \left(c\xi^k u_1 + \sum_{j=2}^{j=n} \psi_j(\xi) \bar{u}_j \right) u, \quad \forall L \in Gr_{\mathbb{C}}(n-1, n).$$

On déduit trivialement que $\mu_0(\tilde{A}) = k$. ■

3.5 Fonction de Green avec pôle à l'infini, inégalité de Bernstein-Walsh et compact HCP de $\mathbb{C}^n$

Soit E un sous-ensemble de $\mathbb{C}^n$. On notera la classe de Lelong, $L_E(\mathbb{C}^n)$, que l'on définira comme ci-dessous :

$$L_E(\mathbb{C}^n) := \{u \in PSH(\mathbb{C}^n) : u|_E \leq 0, \exists c_u \in \mathbb{R}, u \leq c_u + \log(1 + |z|)\},$$

où $|z| := \max_{1 \leq j \leq n} |z_j|$, avec $z = (z_1, \dots, z_n)$.

La fonction de Green avec pôle à l'infini associée au compact E est définie ainsi :

$$V_E(z) := \sup \{u(z) : u \in L_E(\mathbb{C}^n)\}, \quad \forall z \in \mathbb{C}^n.$$

Il est possible de réduire l'ensemble $L_E(\mathbb{C}^n)$ pour définir V_E , si l'on suppose que E est compact. En effet, si

$$L_E^+(\mathbb{C}^n) := \{u \in PSH(\mathbb{C}^n) : u|_E \leq 0, u \geq 0, \exists c_u \in \mathbb{R}, u \leq c_u + \log(1 + |z|)\},$$

on a même

$$V_E(z) := \sup \{u(z) : u \in L_E^+(\mathbb{C}^n) \cap \mathcal{C}^\infty(\mathbb{C}^n)\}, \quad \forall z \in \mathbb{C}^n.$$

On appellera la régularisée supérieure de la fonction V_E la plus petite fonction semi-continue supérieurement majorant V_E . On la note V_E^* et on la définit comme ci-dessous :

$$V_E^*(z) := \limsup_{\zeta \rightarrow z, \zeta \in \mathbb{C}^n} V_E(\zeta).$$

Si E est non pluripolaire (*i.e.* $\forall u \in PSH(\mathbb{C}^n), E \not\subset u^{<-1>}(-\infty)$) la fonction $V_E^* \in PSH(\mathbb{C}^n)$. Nous avons le théorème d'approximation de V_E dû à Siciak.

$$V_E = \log(\Phi_E) \tag{2}$$

où

$$\Phi_E(z) := \sup \left\{ |p(z)|^{\frac{1}{\deg(p)}} : p \in \mathbb{C}[z_1, \dots, z_n], \|p\|_E \leq 1, \deg(p) \geq 1 \right\}, \quad z \in \mathbb{C}^n.$$

$\|\cdot\|_E$ est la norme uniforme sur le compact E . A partir de l'égalité (2), nous déduisons trivialement l'inégalité de Bernstein-Walsh :

$$|p(z)| \leq \|p\|_E e^{(\deg(p) V_E(z))}, \quad \forall p \in \mathbb{C}[z_1, \dots, z_n], \forall z \in \mathbb{C}^n. \tag{3}$$

On trouvera plus de précisions sur les démonstrations des propriétés de la fonction de Green avec pôle à l'infini et du théorème de Siciak dans son papier fondamental [6] ou dans l'ouvrage [12].

Si E est un compact de $\mathbb{C}^n$, non pluripolaire, nous dirons que E à la propriété d'*HCP* (*Hölder Continuity Principe*), s'il existe δ_0 , C , $\alpha > 0$ des constantes ne dépendant que de E telles que :

$$\forall \delta \in [0, \delta_0], \forall z \in \mathbb{C}^n, d(z, E) \leq \delta \implies V_E(z) \leq C\delta^\alpha \text{ (} d \text{ métrique Euclidienne).}$$

Si un compact à la propriété d'*HCP*, la fonction V_E est continue ; ceci implique que le compact E est *L-régulier* (c.f.[6]).

Nous dirons que E est localement *HCP*, si pour tout $a \in E$, il existe $\varepsilon > 0$, tel que $E \cap B(a, \varepsilon)$ vérifie la propriété d'*HCP*. Pour plus de commodité grammaticale et syntaxique, nous écrirons simplement que E est *HCP* ou E est *localement HCP*. Parfois, par abus de langage, nous préciserons la valeur de la constante α en parlant d'*HCP* d'exposant ou d'ordre α , s'il n'y a pas de confusions possible.

Il est évident, qu'avec l'inégalité de Benstein-Walsh (3) et les inégalités de Cauchy, qu'un compact de $E \subset \mathbb{C}^n$ *HCP* admette des Inégalités de Markov.

La notion de d'*HCP* a été explorée par Plesniak et Pawlucki dans l'article [19] de manière très approfondie.

4 Continuité de Hölder de la fonction extrême dans le sous-ensemble algébrique $\tilde{A}$

Dans cette partie, nous allons affaiblir la notion d'*HCP* pour les courbes algébriques de $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) en la restreignant au sous-ensemble algébrique complexifié. Pour ce faire, nous introduirons la métrique des géodésiques dans la courbe complexifiée et nous verrons, modulo une certaine compatibilité pour cette métrique, que cette notion d'*HCP* impliquera encore l'existence d'inégalités de Markov tangentielles.

En définitive, il ne sera pas nécessaire de montrer la propriété d'*HCP* dans $\mathbb{C}^n$, mais seulement dans une partie de dimension complexe 1.

4.1 Prolongement de la paramétrisation de Puiseux pour les courbes algébriques complexes

Pour obtenir le prolongement de la paramétrisation de Puiseux, il est nécessaire de construire une projection globale $\pi : \tilde{A} \rightarrow \mathbb{C}_1$ propre.

Proposition 3 Soient $G = G' \times G''$, où G' et G'' sont deux sous-ensembles ouverts respectifs de $\mathbb{C}^p$ et $\mathbb{C}^m$ ($m + p = n$), et $\pi : (z', z'') \mapsto z'$. Soit $\tilde{A}$ un sous-ensemble analytique de G tel que $\pi : \tilde{A} \rightarrow G'$ soit une application propre. Alors $\tilde{A}' = \pi(\tilde{A})$ est un sous-ensemble analytique de G' , et le nombre

de pré-images $\pi^{-1}(\{z'\})$, ($z' \in G'$) est localement fini dans G' . Si, de plus, $G = \mathbb{C}^n$, $G' = \mathbb{C}^p$ et $\tilde{A}$ est un sous-ensemble algébrique de $\mathbb{C}^n$, alors $\tilde{A}' = \pi(\tilde{A})$ est aussi un sous-ensemble algébrique de $\mathbb{C}^p$.

On trouvera la démonstration de la proposition 2 dans le livre de Chirka ([4], §3.2, page 29).

Lemme 2 Soit A un sous-ensemble algébrique de $\mathbb{R}^n$ de dimension 1 et $\tilde{A}$ son complexifié dans $\mathbb{C}^n$ tel que $A = \tilde{A} \cap \mathbb{R}^n$. Alors il existe une transformation unitaire de $\mathbb{C}^n$ telle que $l(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$ et $\pi : l(\tilde{A}) \longrightarrow \mathbb{C}_1$ soit propre.

Preuve : On injecte $\mathbb{C}^n$ dans $\mathbb{P}_n(\mathbb{C})$, H_0 sera l'hyperplan à l'infini identifié $\mathbb{P}_{n-1}(\mathbb{C})$ dans $\mathbb{P}_n(\mathbb{C})$ de sorte que $\mathbb{P}_n(\mathbb{C}) = \mathbb{P}_{n-1}(\mathbb{C}) \cup \mathbb{C}^n$. La courbe A est algébrique, donc il existe des polynômes $p_1, \dots, p_s$ dans $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$, $s \in \mathbb{N}^*$, tels que :

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n : p_1(x) = \dots = p_s(x) = 0\}.$$

Si d_j est le degré du polynôme p_j , pour tout $j \in \{1, \dots, s\}$, nous avons alors la décomposition suivante pour tous les polynômes p_j :

$$p_j(x) = h_j(x) + q_j(x), \quad \forall j \in \{1, \dots, s\},$$

où les h_j sont des polynômes homogènes dans $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ de degré d_j et les q_j sont des polynômes dans $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ tels que $\deg(q_j) < d_j$. Considérons le sous-ensemble algébrique projectif V , défini comme ci-dessous :

$$V := \{[z] \in \mathbb{P}_{n-1}(\mathbb{C}) : h_1(z) = \dots = h_s(z) = 0\}$$

avec

$$V \subset H_0, \quad H_0 = \mathbb{P}_{n-1}(\mathbb{C}).$$

Le sous-ensemble algébrique projectif V est bien défini puisque les h_j sont des polynômes homogènes et V est propre, car les h_j ne sont pas tous nuls. Maintenant identifions $Gr_{\mathbb{C}}(n, 1)$ et $\mathbb{P}_{n-1}(\mathbb{C})$. Soit

$$\mathcal{L} := \left\{ \tilde{L} \in Gr_{\mathbb{C}}(n, 1) : \tilde{L} \subset \tilde{A} \right\},$$

il est évident de voir que $\mathcal{L}$ est un fermé d'intérieur vide dans $Gr_{\mathbb{C}}(n, 1)$. Posons donc

$$\mathcal{M} := Gr_{\mathbb{C}}(n, 1) \setminus \mathcal{L},$$

il s'en suit que $\mathcal{M}$ est un ouvert partout dense dans $Gr_{\mathbb{C}}(n, 1)$. Définissons l'ensemble suivant :

$$\mathcal{B} := \left\{ \tilde{L} \in Gr_{\mathbb{C}}(n, 1) : \exists v_n \in \mathbb{R}^n, \|v_n\|_2 = 1, \tilde{L} = \mathbb{C}v_n, [v_n] \notin V \right\}.$$

De toute évidence $\mathcal{B} \neq \emptyset$, car $\deg(h_j) = \deg(p_j)$ implique que V est au plus une hypersurface. Supposons maintenant que $\mathcal{B} \not\subset \mathcal{M}$. Donc il existe $\tilde{L} \in \mathcal{B}$ tel que $\tilde{L} \notin \mathcal{M}$. Il s'en suit que $\tilde{L} \subset \tilde{A}$. Choisissons v_n dans $\mathbb{R}^n$ tel que $\tilde{L} = \mathbb{C}v_n$, car $\tilde{L}$ est dans $\mathcal{B}$. Posons $L = \mathbb{R}v_n$. Nous avons :

$$L \subset \tilde{L} \subset \tilde{A} \implies L \subset A.$$

Donc

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad p_1(\lambda v_n) = \dots = p_s(\lambda v_n) = 0$$

Soit encore

$$\forall \lambda > 0, \quad \frac{1}{\lambda^{d_1}} p_1(\lambda v_n) = \dots = \frac{1}{\lambda^{d_s}} p_s(\lambda v_n) = 0.$$

Si $\lambda \rightarrow \infty$, cela nous donne :

$$h_1(v_n) = \dots = h_s(v_n) = 0,$$

donc $[v_n]$ est dans V , ce qui est une contradiction. En conclusion $\mathcal{B} \subset \mathcal{M}$. Soient, maintenant, les polynômes homogénéisés des p_j définis comme ci-dessous :

$$p_j^*(z_0, \dots, z_n) := z_0^{d_j} p_j\left(\frac{z_1}{z_0}, \dots, \frac{z_n}{z_0}\right), \quad j \in \{1, \dots, s\}.$$

Les p_j^* sont des polynômes homogènes de $\mathbb{C}[z_0, \dots, z_n]$. Considérons la variété projective de $\mathbb{P}_n(\mathbb{C})$

$$\tilde{A} := \{[z] \in \mathbb{P}_n(\mathbb{C}) : p_1^*(z) = \dots = p_s^*(z) = 0\}.$$

Comme pour tout $j \in \{1, \dots, s\}$, on a $p_j = p_j^*|_{\mathbb{C}^n}$. Il s'en suit que $\tilde{A} = \mathbb{C}^n \cap \tilde{\tilde{A}}$. Étant donné que $\tilde{\tilde{A}}$ est fermé, nous en déduisons successivement les inclusions suivantes :

$$\overline{\tilde{A}} \subset \tilde{\tilde{A}} \quad \text{et} \quad \overline{\tilde{A}} \setminus \tilde{A} \subset \tilde{\tilde{A}}.$$

On a aussi $\tilde{\tilde{A}} \cap H_0 = V$, par conséquent $\overline{\tilde{A}} \cap H_0 \subset V$, et $\tilde{A} \cap H_0 = \emptyset$. Avec l'inclusion ci-dessous :

$$\tilde{A} \subset \overline{\tilde{A}} \subset \tilde{\tilde{A}}$$

et

$$\tilde{A} \subset \overline{\tilde{A}} \cap \mathbb{C}^n \subset \tilde{\tilde{A}} \cap \mathbb{C}^n = \tilde{A}.$$

Donc

$$\tilde{A} = \overline{\tilde{A}} \cap \mathbb{C}^n = \tilde{\tilde{A}} \cap \mathbb{C}^n.$$

Montrons que $\overline{\tilde{A}} \setminus \tilde{A} \subset V$. On a

$$\overline{\tilde{A}} = \overline{\tilde{A} \cap (H_0 \cup \mathbb{C}^n)} = (\overline{\tilde{A} \cap H_0}) \cup (\overline{\tilde{A} \cap \mathbb{C}^n}) = (\overline{\tilde{A} \cap H_0}) \cup \tilde{A}.$$

De plus $\overline{\tilde{A}} = (\overline{\tilde{A} \setminus \tilde{A}}) \cup \tilde{A}$. Donc on a l'égalité ci-dessous :

$$(\overline{\tilde{A} \setminus \tilde{A}}) \cup \tilde{A} = (\overline{\tilde{A} \cap H_0}) \cup \tilde{A} \quad (\diamond_1)$$

Choisissons $[z] \in \overline{\tilde{A} \setminus \tilde{A}}$, on a $[z] \notin \tilde{A}$. Avec l'égalité $(\diamond_1)$, on en déduit que $[z] \in \overline{\tilde{A} \cap H_0}$, soit $\overline{\tilde{A} \setminus \tilde{A}} \subset \overline{\tilde{A} \cap H_0}$. L'inclusion voulue est démontrée, sachant que nous avons $\overline{\tilde{A} \cap H_0} \subset V$, d'où :

$$\overline{\tilde{A} \setminus \tilde{A}} \subset V \subset H_0.$$

Choisissons maintenant $\tilde{L}$ dans $\mathcal{B}$. Nous avons $\tilde{L} \not\subset \tilde{A}$ et $L \not\subset A$. Il s'en suit que $\tilde{L} \cap \tilde{A}$ est une sous-ensemble algébrique propre de $\tilde{L}$. Comme $\tilde{L}$ est de dimension complexe 1 et $\tilde{A}$ algébrique, $\tilde{L} \cap \tilde{A}$ est fini, donc $L \cap A$ aussi. Construisons maintenant la transformation unitaire l . Choisissons v_n tel que $\|v_n\|_2 = 1$ et $\mathbb{C}v_n = \tilde{L}$. Rappelons que $\mathbb{C}^n$ est muni du produit scalaire ci-dessous :

$$\forall z, \zeta \in \mathbb{C}^n, \quad (z|\zeta) := \sum_{j=1}^{j=n} z_j \overline{\zeta_j},$$

avec $z = (z_1, \dots, z_n)$, $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n)$. Construisons par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt une base $\mathbb{R}$ -orthogonale dans $L^{\perp_{\mathbb{R}}}$. Nommons la $(v_1, \dots, v_{n-1})$. La base $(v_1, \dots, v_{n-1})$ est $\mathbb{C}$ -libre. Nous avons donc $\dim_{\mathbb{C}} \text{Vect}_{\mathbb{C}}(v_1, \dots, v_{n-1}) = n - 1$. Il s'en suit que :

$$\text{Vect}_{\mathbb{C}}(v_1, \dots, v_{n-1}) = \tilde{L}^{\perp_{\mathbb{C}}} \text{ tel que } \tilde{L} \oplus \tilde{L}^{\perp_{\mathbb{C}}} = \mathbb{C}^n.$$

On a

$$\forall a \in \tilde{A}, \quad (\overline{\tilde{A} \setminus \tilde{A}}) \cap \tilde{L} \subset V \cap \overline{(a + \tilde{L})} = \emptyset,$$

car V est un sous-ensemble de H_0 et $[v_n]$ n'appartient pas à V . On en déduit que la projection ci-dessous :

$$\pi_{\tilde{L}} : \tilde{A} \longrightarrow \tilde{L}^{\perp_{\mathbb{C}}} \quad (\diamond_2)$$

est propre. D'après la construction de $\tilde{L}$ et $\tilde{L}^{\perp}$, il existe donc une unique transformation unitaire l_1 de $\mathbb{C}^n$ telle que

$$(l_1(v_j)|e_k) = \delta_{j,k}, \quad \forall j, k \in \{1, \dots, n\},$$

avec $\delta_{i,j}$ symbole de Kronecker, et on a

$$l_1(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n.$$

On déduit d'après ce qui précède, c'est-à-dire $(\diamond_2)$, que la projection :

$$\begin{array}{ccc} \pi^1 & : & l_1(\tilde{A}) \longrightarrow \mathbb{C}_{n-1} \\ & & (z', z_n) \longmapsto z' \end{array}$$

est propre. Notons maintenant $\tilde{A}_1 = \tilde{A}$. D'après la proposition 3, $\pi^1(l(\tilde{A}_1))$ est algébrique dans $\mathbb{C}_{n-1}$. Construisons par récurrence descendante la suite $(\pi^i, l_i, \tilde{A}_i)$, pour tout $i \in \{2, \dots, n-1\}$, telle que :

$$\pi^i : l_i(\tilde{A}_i) \longrightarrow \mathbb{C}_{n-i}, \quad \tilde{A}_i = \pi^{i-1} \left(l_{i-1}(\tilde{A}_{i-1}) \right), \quad \forall i \in \{2, \dots, n-1\},$$

où π^i est une projection propre telle que $\pi^i(\mathbb{R}^{n-i}) = \mathbb{R}^{n-i-1}$, $\tilde{A}_i$ est un sous-ensemble algébrique et l_i est dans $O(\mathbb{C}, n-i)$, l'ensemble des transformations unitaires de $\mathbb{C}^{n-i}$ et $l_i(\mathbb{R}^{n-i}) = \mathbb{R}^{n-i}$. Nous avons les inclusions suivantes :

$$\begin{array}{ccc} j_i & : & O(\mathbb{C}, i) \longrightarrow O(\mathbb{C}, i+1) \\ & & l_{n-i+1} \longmapsto l_{n-i+1} \oplus id_{\mathbb{C}_{(i+1)}} \end{array}, \quad \forall i \in \{2, \dots, n-1\},$$

où $\mathbb{C}_{(i)}$ est le sous-espace $\{0_{\mathbb{C}^{i-1}}\} \times \mathbb{C}$ de $\mathbb{C}^n$. Il s'en suit que si l'on pose $\tilde{l} = (l_{n-1} \oplus id_{\mathbb{C}_{(3)}}) \circ \dots \circ (l_2 \oplus id_{\mathbb{C}_{(n)}}) \circ l_1$, $\tilde{l}$ se trouve dans $O(\mathbb{C}, n)$, telle que $\tilde{l}(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$. Si $\pi = \pi^n \circ \dots \circ \pi^1$, où $\pi^n : l_{n-1}(\tilde{A}_{n-1}) \longrightarrow \mathbb{C}_1$ est la projection propre choisie comme π^1 pour le sous-ensemble algébrique $\tilde{A}_{n-1}$. On a donc :

$$\begin{array}{ccc} \pi & : & l(\tilde{A}) \longrightarrow \mathbb{C}_1 \\ & & (z_1, \dots, z_n) \longmapsto z_1 \end{array}$$

est propre car toutes les projections π^i le sont, donc π et l vérifient les conditions requises du lemme. ■

Proposition 4 *Supposons A une courbe algébrique réelle, localement irréductible, telle que $0 \in \tilde{A}_{sing}$ et φ la paramétrisation de Puiseux de la proposition 2. Modulo un changement de coordonnées unitaire dans $\mathbb{C}^n$, laissant A dans $\mathbb{R}^n$, il existe Ψ une application holomorphe définie dans Ω' ouvert de $\mathbb{C}$ partout dense, avec $\overline{D(0,1)} \subset \Omega'$, telle que Ψ prolonge ψ à Ω' et pour tout z dans Ω' , $|\Psi(z)| \leq C(1 + |z|^{sk})$, où $C, s > 0$ sont des constantes ne dépendant que de $\tilde{A}$.*

Preuve : On peut donc choisir, d'après le lemme 2 du 4.1, un changement de coordonnées unitaire et une projection $\pi : \tilde{A} \longrightarrow \mathbb{C}_1$, $\pi(\xi_1, \dots, \xi_n) = \xi_1$, propre telle que $\pi(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}$. Comme $\tilde{A}$ est supposée algébrique, d'après la proposition 1 du 3.2, il existe deux constantes réelles strictement positives C, s telles que :

$$(|\xi_2|^2 + \dots + |\xi_n|^2)^{\frac{1}{2}} \leq C(1 + |\xi_1|^s). \quad (4)$$

La projection π est propre, donc il existe $\sigma_1 \subset \mathbb{C}_1$ un sous-ensemble fini ($0 \in \sigma_1$ car $0 \in \tilde{A}_{sing}$), sachant que $\tilde{A}$ est de dimension complexe 1 et algébrique, tel que,

$$\pi : \tilde{A} \setminus \pi^{<-1>}(\sigma_1) \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \sigma_1$$

soit un r -revêtement holomorphe ($r \in \mathbb{N}^*$), avec

$$\forall z_1 \in \mathbb{C} \setminus \sigma_1, \quad \text{card} \left(\pi^{<-1>}(z_1) \cap \tilde{A} \right) = r.$$

Donc pour tout $z_1 \in \mathbb{C}_1 \setminus \sigma_1$, il existe de $V_{z_1,j}$, ($\forall j \in \{1, \dots, r\}$) des ouverts de $\tilde{A} \setminus \pi^{<-1>}(\sigma_1)$ et $W_{z_1} \in \mathcal{V}_{\mathbb{C}_1}(z_1)$ (voisinage ouvert de z_1) avec $\alpha_{z_1,j} \in H(W_{z_1})$ ($\forall j \in \{1, \dots, r\}$).

$$\begin{array}{ccc} \alpha_{z_1,j} : & W_{z_1} & \longrightarrow V_{z_1,j} \\ & \xi & \longmapsto (\xi, \alpha_{z_1,j}(\xi)). \end{array}$$

Posons $\Omega = \mathbb{C}_1 \setminus \Delta$, où Δ est un ensemble fini de demi-droites de $\mathbb{C}_1$ ayant pour origine tous les points de σ_1 , contenant en particulier $[0, +\infty[$, rendant ainsi Ω simplement connexe¹. En appliquant le théorème de la monodromie, il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in H(\Omega)$ tels que :

$$\forall z_1 \in \Omega, \exists W_{z_1} \in \mathcal{V}_{\mathbb{C}_1}(z_1), \forall j \in \{1, \dots, r\}, \quad \alpha_j|_{W_{z_1}} = \alpha_{z_1,j}.$$

Modulo un changement d'indices choisissons $U \in \mathcal{V}_{\mathbb{C}^n}(0)$ où $U = U' \times U'' \subset \mathbb{C} \times \mathbb{C}^{n-1}$ tel que :

$$\begin{array}{ccc} \pi|_U : & \tilde{A} \cap U & \longrightarrow U' \\ & (\xi_1, \dots, \xi_n) & \longmapsto \xi_1 \end{array}$$

soit une application propre, $\pi^{<-1>}(0) \cap \tilde{A} \cap U = \{0\}$ et $\tilde{A} \cap U$ soit irréductible, rappelons que la courbe algébrique réelle A est localement irréductible dans les hypothèses de notre lemme. D'après le théorème de structure locale des sous-ensembles analytiques, il existe $\sigma_2 \subset \mathbb{C}_1$ ($\sigma_2 \subset \sigma_1$) fini tel que $\pi : (\tilde{A} \cap U) \setminus \pi^{<-1>}(\sigma_2) \longrightarrow \mathbb{C}_1 \setminus \sigma_2$ soit un k -revêtement holomorphe ramifié ($k \in \mathbb{N}^*$). Construisons la paramétrisation de Puiseux associée à la singularité

¹L'auteur remercie Julien Duval pour cette idée.

0 de $\tilde{A}$ à partir de la projection $\pi|_U$ (c.f. la proposition 2 du 3.4), soit $\varphi(z) = (cz^k, \psi(z))$ cette paramétrisation avec $k = \mu_0(\tilde{A})$. Considérons les secteurs suivants, si $\overline{D'(0,1)} = \overline{D(0,1)} \setminus \{0\}$,

$$\mathcal{S}_j := \left\{ z \in D'(0,1) : \frac{2\pi j}{k} < \arg(z) \leq \frac{2\pi(j+1)}{k} \right\}, \quad (\forall j \in \{0, \dots, k-1\}).$$

Définissons les changements de coordonnées locales suivantes :

$$\begin{aligned} \theta_j : \overline{D'(0,1)} &\longrightarrow \mathcal{S}_j \\ \xi &\longmapsto \left(\frac{\xi}{c}\right)^{\frac{1}{k}}. \end{aligned}$$

On a évidemment $\theta_j \in H(\overline{D'(0,1)})$. Posons $\mathcal{S}'_j = \mathcal{S}_j \setminus \Delta_j$, $\Delta_j := \theta_j(\Delta)$, et $\Omega_j := \theta_j(\Omega)$, on voit que $\Omega_j \subset \mathcal{S}'_j$. D'après le théorème de l'image ouverte Ω_j est ouverte. Il est clair que θ_j paramétrise $\mathcal{S}'_j$ sur $\overline{D(0,1)} \setminus \Delta \subset \overline{D'(0,1)}$. Donc $\varphi \circ \theta_j$ paramétrise un morceau d'une feuille au dessus de $\overline{D(0,1)} \setminus \Delta \subset \mathbb{C}_1$. On en déduit l'existence d'un α_{i_j} , tel que $\psi \circ \theta_j = \alpha_{i_j}$ sur Ω . Donc la fonction ψ se prolonge sur l'ouvert Ω_j et de l'inégalité (4) on déduit, pour tout $z \in \Omega_j$, $|\psi(z)| \leq c_j(1 + |z|)^{sk}$ ($\forall j \in \{0, \dots, k-1\}$). On déduit de même que ψ se prolonge sur chaque Ω_j . Comme les prolongées coïncident sur $\overline{D'(0,1)} \setminus \Delta'$, alors d'après le théorème du prolongement analytique, ψ se prolonge sur l'ouvert Ω' défini par :

$$\Omega' = \bigcup_{1 \leq j \leq k-1} \Omega_j.$$

Soit Ψ sa prolongée, elle vérifie donc :

$$\forall z \in \Omega', \quad |\Psi(z)| \leq c(1 + |z|^{sk}),$$

avec $\overline{\Omega'} = \mathbb{C}_1$. ■

Dans le corollaire 3, nous démontrons, sans le dire, une version globale du théorème des fonctions implicites.

Précisons dans le corollaire ci-dessous ce qui diffère lorsque l'on choisit le point x_0 dans A_{reg} .

Corollaire 3 *Soit A une courbe algébrique réelle de $\mathbb{R}^n$ localement irréductible. Soit x_0 dans $\tilde{A}_{reg}$ fixé. Modulo un changement de coordonnées unitaire laissant A dans $\mathbb{R}^n$, il existe une paramétrisation holomorphe $\varphi(z) = (cz, \psi(z))$, telle que $\varphi : \overline{D(0,1)} \rightarrow \tilde{A} \cap U$, où $U = \varphi(\overline{D(0,1)})$ et $\varphi([-1,1]) = A \cap U$. Cette paramétrisation se prolonge dans Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ partout dense, telle que $|\psi(z)| \leq c(1 + |z|^s)$, pour tout z dans $\mathbb{C}$. Où c et s sont des constantes dépendant uniquement de la courbe A .*

Étant donné la forte similitude de cette démonstration avec celle du corollaire 3, nous nous permettrons d'être un peu plus expéditif, quant à la démonstration de celui-ci.

Preuve : D'après le lemme 2 du 4.1, il existe un changement de coordonnées unitaire laissant A dans $\mathbb{R}^n$, tel que la projection,

$$\begin{aligned} \pi & : \quad \tilde{A} & \longrightarrow & \mathbb{C}_1 \\ & (z_1, \dots, z_n) & \longmapsto & z_1, \end{aligned}$$

soit propre. Sans perdre de généralité, on peut supposer que $x_0 = 0$ et $0 \in A_{reg}$. Il existe σ un sous-ensemble, formé de points isolés, inclus dans $\mathbb{C}$, tel que

$$\pi : \tilde{A} \setminus \pi^{<-1>}(\sigma) \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \sigma,$$

soit un r -revêtement ramifié. En opérant de la même manière qu'à la proposition 4 du 4.1, il existe un ouvert Ω de $\mathbb{C}$ partout dense et simplement connexe et des fonctions α_j ($j \in \{1, \dots, r\}$) holomorphes dans Ω telle que $\psi = \alpha_j|_{D(0,1)}$. Étant donné que la projection est propre et la courbe $\tilde{A}$ est algébrique, on a, d'après la proposition 1 du 3.2, l'estimation suivante :

$$|\psi(z)| \leq c(1 + |z|^s), \quad \forall z \in \Omega,$$

d'où le corollaire souhaité. ■

4.2 Estimation de la fonction extrémale

Nous allons estimer la fonction de Green avec pôle à l'infini sur un voisinage de la courbe algébrique réelle. Nous remarquerons que la proposition 5, ci-après, nous donne une autre démonstration d'une partie du théorème de Sadullaev [2].

Dans la proposition suivante les hypothèses sur A sont les mêmes que dans la proposition 4 du 4.1 et la paramétrisation de Puiseux φ est celle obtenue dans la proposition 2 du 3.4.

Proposition 5 *Modulo un changement de coordonnées unitaire laissant A dans $\mathbb{R}^n$, il existe des constantes réelles c_1, c_2, ε_0 et ρ_1 strictement positives dépendant uniquement de φ telles que : $\forall \varepsilon \in [0, \varepsilon_0[, \forall z \in D(0, \rho)$,*

$$\begin{aligned} V_{A \cap B(0, c_1 \varepsilon^k)} \circ \varphi(z) & \leq c_2 V_{\varepsilon \mathcal{R}^{<r_A^+>}}(z), \\ \left(\text{resp. } V_{A \cap B(0, c_1 \varepsilon^k)} \circ \varphi(z) & \leq c_2 V_{\varepsilon \mathcal{R}^{<r_A^->}}(z), \right) \end{aligned} \tag{5}$$

avec

$$\mathcal{R}^{<r_A^+>} = \bigcup_{1 \leq j \leq r_A^+} \left[0, e^{\frac{2ik_j\pi}{k}}\right], \quad \left(\text{resp. } \mathcal{R}^{<r_A^->} = \bigcup_{1 \leq j \leq r_A^-} \left[0, e^{\frac{2ik'_j\pi}{k}}\right], \right)$$

où $k = \mu_0(\tilde{A})$, r_A^+ (resp. r_A^-) est le nombre de composantes connexes de $A \cap B(0, c_1\varepsilon^k) \cap \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n : \Re(z_1) > 0\}$ (resp. le nombre de composantes connexes de $A \cap B(0, c_1\varepsilon^k) \cap \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n : \Re(z_1) < 0\}$). L'ensemble $\mathcal{R}^{<r_A^+>}$ et $0 \leq k_1 < \dots < k_{r_A^+} \leq k$ (resp. $\mathcal{R}^{<r_A^->}$ et $0 \leq k'_1 < \dots < k'_{r_A^-} \leq k$) sont construits comme dans la proposition 2 du 3.4.

Preuve : Montrons l'estimation (5) pour $\mathcal{R}^{<r_A^+>}$ seulement, la démonstration sera la même pour $\mathcal{R}^{<r_A^->}$. Posons $\varphi(z) = (cz^k, \psi_2(z), \dots, \psi_n(z))$, $\forall z \in \overline{D(0, 1)}$ (cf. la proposition 2 du 3.4); soit $\varepsilon_0 \in]0, 1[$, de sorte que $\varphi(\overline{D(0, \varepsilon)}) \subset B_{\mathbb{C}^n}(0, c_1\varepsilon^k)$, pour tout ε dans $]0, \varepsilon_0[$. Remarquons que nous avons les inclusions suivantes : $\forall \varepsilon \in]0, \varepsilon_0[$,

$$\varphi(\mathcal{R}^{<r_A^+>}) \subset A, \quad \varphi(\varepsilon \mathcal{R}^{<r_A^+>}) \subset A \cap \varphi(\overline{D(0, \varepsilon)}) \subset A \cap B_{\mathbb{C}^n}(0, c_1\varepsilon^k). \quad (6)$$

Celles-ci entraînent les inclusions ci-après :

$$L_{A \cap B(0, c_1\varepsilon^k)}(\mathbb{C}^n) \subset L_{A \cap \varphi(D(0, \varepsilon))}(\mathbb{C}^n) \subset L_{\varphi(\varepsilon \mathcal{R}^{<r_A^+>})}(\mathbb{C}^n).$$

Nous allons directement majorer la fonction $V_{A \cap B(0, c_1\varepsilon^k)}$. D'après la proposition 4 du 4.1, φ se prolonge en une fonction holomorphe dans un ouvert partout dense Ω de $\mathbb{C}$ telle que, $\max_{2 \leq j \leq n} |\psi_j(z)| \leq C(1 + |z|^s)$, pour tout $z \in \Omega$. Etant donné que $\varepsilon \mathcal{R}^{<r_A^+>}$ est un continu et que φ est une fonction holomorphe de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}^n$, il s'en suit que $\varphi(\varepsilon \mathcal{R}^{<r_A^+>})$ n'est pas L -polaire, par conséquent $A \cap B(0, c_1\varepsilon^k)$ non plus. Donc, d'après ([12], Corollaire 5.2.2, page 193), il existe une constante réelle strictement positive $C_{\varphi, A, \varepsilon}$ telle que :

$$u \circ \varphi(z) \leq C_{\varphi, A, \varepsilon} + s \log(1 + |z|), \quad \forall z \in \Omega, \quad \forall u \in L_{A \cap B(0, c_1\varepsilon^k)}(\mathbb{C}^n).$$

Soit u dans $L_{A \cap B(0, c_1\varepsilon^k)}(\mathbb{C}^n)$, il s'en suit, de ce qui précède, que $u \circ \varphi(z) \leq C_{\varphi, A, \varepsilon} + s \log(1 + |z|)$, pour tout z dans Ω . Soit ρ une constante réelle dans $]\varepsilon_0, 1[$ et considérons la fonction auxiliaire H_α , comme suit :

$$H_\alpha(z) := \left[s \log \left(\frac{|z| - \rho_1}{1 - \rho_1} \right) + \alpha \right]^+, \quad \forall z \in \mathbb{C}, \quad \forall \alpha > 0,$$

où

$$x^+ = \max(0, x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

La fonction H_α est sous-harmonique dans $\mathbb{C}$, $\forall \alpha > 0$ et vérifie les propriétés ci-dessous :

- $H_\alpha(z) = 0, \quad \forall z \in D(0, \rho).$
- $H_\alpha(z) \geq \alpha, \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus D(0, 1).$
- $H_\alpha(z) \leq c_\alpha + s \log(1 + |z|), \quad \forall z \in \mathbb{C},$ c_α étant une constante réelle strictement positive.

Maintenant, choisissons $\alpha > 0$ suffisamment grand de sorte que $H_\alpha(z) \geq u \circ \varphi(z)$, pour tout z dans $\Omega \setminus D(0, 1)$. Pour cela minorons $\Delta_\alpha(z) := H_\alpha(z) - u \circ \varphi(z)$ dans Ω ,

$$\Delta_\alpha(z) \geq s \left[\log \left(1 - \frac{\rho}{|z|} \right) - \log \left(1 + \frac{1}{|z|} \right) \right] - s \log(1 - \rho) + \alpha - C_{\varphi, A, \varepsilon}, \quad \forall z \in \Omega \setminus D(0, 1),$$

$$\Delta_\alpha(z) \geq s \log \left(1 + \frac{-1 - \rho}{|z| + 1} \right) + \alpha - C_{\varphi, A, \varepsilon} - s \log(1 - \rho), \quad \forall z \in \Omega \setminus D(0, 1).$$

Donc, si on choisit $\alpha > 0$ assez grand, on a $\Delta_\alpha(z) \geq 0$ pour tout z dans $\Omega \setminus D(0, 1)$. D'après la construction de l'ouvert Ω de la proposition 4 du 4.1 et le choix de α , nous avons

$$\forall z \in \partial\Omega, \quad \limsup_{\zeta \rightarrow z, \zeta \in \Omega} u \circ \varphi(\zeta) \leq H_\alpha(z),$$

donc d'après ([12], Corollaire 2.9.14, page 69), la fonction :

$$W_\alpha(z) = \begin{cases} \max(u \circ \varphi(z), H_\alpha(z)), & z \in \Omega \\ H_\alpha(z), & z \in \mathbb{C} \setminus \Omega \end{cases}$$

est bien définie et sous-harmonique dans $\mathbb{C}$, $\frac{1}{s}W_\alpha \in L_{\varphi(\varepsilon\mathcal{R}^{<r_A^+>})}(\mathbb{C}^n)$ et $W_\alpha|_{D(0, \rho)} = u \circ \varphi$. Il s'en suit que

$$u \circ \varphi(z) \leq W_\alpha(z) \leq sV_{\varepsilon\mathcal{R}^{<k>}}(z), \quad \forall z \in D(0, \rho).$$

Nous concluons donc

$$u \circ \varphi(z) \leq sV_{\varepsilon\mathcal{R}^{<r_A^+>}}(z), \quad \forall z \in D(0, \rho_1), \quad \forall u \in L_{A \cap B(0, c_1 \varepsilon^k)}(\mathbb{C}^n). \quad \blacksquare$$

Remarque : Pour ne pas alourdir la démonstration de la proposition 5, nous n'avons pas détaillé l'hypothèse où la multiplicité k prend la valeur 1. Rappelons que nous avons supposé que 0 est un point de A_{sing} , donc nécessairement k est supérieur ou égal à 2. Ceci dit, l'obtention de l'estimation (5), pour les points non singuliers de $\tilde{A}$, ne diffère pas quant aux techniques de démonstration utilisées, il faut seulement substituer la proposition 4 au corollaire 3 du 4.1. C'est pourquoi, il ne nous semble pas nécessaire de démontrer le corollaire, ci-dessous.

Corollaire 4 *Soit A une courbe algébrique localement irréductible telle que $0 \in A_{reg}$. Modulo un changement de coordonnées unitaires laissant A dans $\mathbb{R}^n$, ils existent des constantes ε_0 , ρ , c_1 et c_2 réelles strictement positives dépendant de la paramétrisation $\varphi(z) = (cz, \psi(z))$ du corollaire 2, telles que*

- si $0 \in A_{reg} \setminus \partial A$,

$$\forall \varepsilon \in [0, \varepsilon_0[, \forall z \in D(0, \rho), V_{A \cap B(0, c_1 \varepsilon)} \circ \varphi(z) \leq c_2 V_{[-\varepsilon, \varepsilon]}(z), \quad (7)$$

- si $0 \in A_{reg} \cap \partial A$,

$$\forall \varepsilon \in [0, \varepsilon_0[, \forall z \in D(0, \rho), V_{A \cap B(0, c_1 \varepsilon)} \circ \varphi(z) \leq c_2 V_{[0, \varepsilon]}(z). \quad (8)$$

Le lemme ci-dessous est dû à Bos [7].

Lemme 3 *Soient b un nombre complexe appartenant à εI , $|b| \neq \varepsilon$ ($I = [-1, 1] \subset \mathbb{C}$) et r strictement positif tel que $r < \varepsilon - |b|$. Alors :*

$$\sup_{D(b, r)} V_{\varepsilon I} \leq c \log(1 + r),$$

où $c = \max \left\{ 1, \frac{2}{\text{dist}(b, \varepsilon \partial I)} \right\}$.

Preuve : Sans perdre de généralité, on peut supposer b strictement positif. Pour démontrer le lemme ci-dessus il suffit d'estimer $\sup_{D(0, r)} V_{I'}$ où $I' = [2b - \varepsilon, \varepsilon]$. On a :

$$\sup_{D(0, r)} V_{I'} = \log \left(\frac{ir}{\varepsilon - b} + \sqrt{\left(\frac{ir}{\varepsilon - b} \right)^2 - 1} \right).$$

Nous rappelons que la fonction de Green avec pôle à l'infini sur le segment $[-1, 1]$ dans $\mathbb{C}$ est connue :

$$V_{[-1, 1]}(z) = \log^+ \left| z + \sqrt{z^2 - 1} \right|, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

■

Lemme 4 *La fonction $V_{[-1, 1]}$ vérifie la propriété de continuité de Hölder avec un exposant $\frac{1}{2}$, c'est-à-dire :*

$$(\forall \delta \in [0, 1])(\forall z \in \mathbb{C}, \text{dist}([-1, 1], z) \leq \delta) \implies V_{[-1, 1]}(z) \leq C \delta^{\frac{1}{2}} \quad (HCP).$$

Où C est une constante réelle strictement positive.

Nous ne donnerons la démonstration de ce dernier lemme, qui pourra être trouvée dans [18] ou dans le livre de M.Klimek [12].

4.3 Métrique des géodésiques et continuité de Hölder dans le sous-ensemble algébrique $\tilde{A}$

Définissons la métrique des géodésiques dans $\tilde{A}$. Considérons l'ensemble $(\mathfrak{S}_{[0,1]}, \preceq)$ des subdivisions de l'intervalle $[0, 1]$ muni de la relation d'ordre suivante : $\forall \sigma, \tau \in \mathfrak{S}_{[0,1]}, \sigma \preceq \tau$ est équivalent à dire que la subdivision σ est moins fine que τ . Maintenant, si γ est une fonction de $[0, 1]$ dans $\tilde{A}$ et σ est dans $\mathfrak{S}_{[0,1]}$, nous définirons $V_\sigma(\gamma)$ de la sorte :

$$V_\sigma(\gamma) := \sum_{j=0}^{p-1} \|\gamma(t_{j+1}) - \gamma(t_j)\|_2, \quad \sigma = (t_0, \dots, t_p), \quad \sigma \in \mathfrak{S}_{[0,1]},$$

où $\|z\|_2 := (\sum_{j=1}^{j=n} |z_j|^2)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall z \in \mathbb{C}^n$. Définissons le sous-ensemble des fonctions à variation bornée ci-dessous :

$$CVB^{(\xi_1, \xi_2)}([0, 1], \tilde{A}) := \left\{ \gamma \in \mathcal{C}^0([0, 1], \tilde{A}) : \gamma(0) = \xi_1, \gamma(1) = \xi_2, \sup_{\sigma \in \mathfrak{S}_{[0,1]}} V_\sigma(\gamma) < +\infty \right\},$$

où $\mathcal{C}^0([0, 1], \tilde{A})$ est l'ensemble des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\tilde{A}$. On peut donc définir désormais une métrique dans $\tilde{A}$ de cette manière,

$$d(\xi_1, \xi_2) := \inf \left\{ V(\gamma) : \gamma \in CVB^{(\xi_1, \xi_2)}([0, 1], \tilde{A}) \right\}, \quad \forall \xi_1, \xi_2 \in \tilde{A},$$

où

$$V(\gamma) := \sup \{ V_\sigma(\gamma) : \sigma \in \mathfrak{S}_{[0,1]} \}.$$

Il est clair que $d(\cdot, \cdot)$ définit bien une métrique dans $\tilde{A}$.

Lemme 5 *Soit $\tilde{A}$ une courbe algébrique complexe localement irréductible . On considère l'espace métrique $(\tilde{A}, d)$, où $d(\cdot, \cdot)$ est la métrique des géodésiques dans $\tilde{A}$. Alors, pour tout ξ_0 dans $\tilde{A}_{reg}$, il existe un voisinage ouvert U de ξ_0 dans $\tilde{A}_{reg}$, une paramétrisation de Puiseux $\varphi : D(0, 1) \rightarrow U$, $\varphi(0) = \xi_0$ et des constantes réelles strictement positives c_1 et c_2 , ne dépendant que de φ tels que,*

$$c_1 |\hat{z}_1 - \hat{z}_2| \leq d(\varphi(\hat{z}_1), \varphi(\hat{z}_2)) \leq c_2 |\hat{z}_1 - \hat{z}_2|, \quad \forall \hat{z}_1, \hat{z}_2 \in D(0, 1). \quad (9)$$

Si de plus ξ_0 est dans $\tilde{A}_{sing}$, il existe U un voisinage ouvert de ξ_0 dans $\tilde{A}$, $\tilde{A}_{sing} \cap U = \{\xi_0\}$ et $\varphi : D(0, 1) \rightarrow U$, $\varphi(0) = \xi_0$ la paramétrisation de Puiseux, on a similairement,

$$c_1 |\hat{z}_1|^k \leq d(\varphi(0), \varphi(\hat{z}_1)) \leq c_2 |\hat{z}_1|^k, \quad \forall \hat{z}_1 \in D(0, 1), \quad (10)$$

où k est la multiplicité complexe du point singulier ξ_0 de $\tilde{A}$.

Preuve : Commençons par démontrer (9). Soient $\xi_0 \in \tilde{A}_{reg}$ et $\varphi : D(0, 1) \rightarrow U$ la paramétrisation de Puiseux. Fixons $\hat{z}_1$ et $\hat{z}_2$ dans $D(0, 1)$. Choisissons γ dans $CVB^{(\varphi(\hat{z}_1), \varphi(\hat{z}_2))}([0, 1], \tilde{A})$ et $\sigma \in \mathfrak{S}_{[0, 1]}$, telle que $\sigma = (t_0, \dots, t_p)$. Sans perdre de généralité, on peut supposer que $\xi_0 = 0$. Posons $\xi_k = \gamma(t_k)$, $\forall k \in \{0, \dots, p\}$. Comme φ est surjective, ils existent $z_0, \dots, z_p$ dans $D(0, 1)$ tels que $z_0 = \hat{z}_1$, $z_p = \hat{z}_2$ et $\xi_k = \varphi(z_k)$, $\forall k \in \{0, \dots, p\}$. Nous avons l'égalité suivante :

$$\xi_{k+1} - \xi_k = \varphi(z_{k+1}) - \varphi(z_k) = \int_0^1 \frac{d}{dt} \varphi(tz_{k+1} + (1-t)z_k) dt.$$

D'où

$$\|\gamma(t_{k+1}) - \gamma(t_k)\|_2 = |z_{k+1} - z_k| \left\| \int_0^1 \varphi'(tz_{k+1} + (1-t)z_k) dt \right\|_2$$

et donc

$$\|\gamma(t_{k+1}) - \gamma(t_k)\|_2 = |z_{k+1} - z_k| \left(\sum_{j=1}^{j=n} \left| \int_0^1 \varphi'_j(tz_{k+1} + (1-t)z_k) dt \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

où les φ_j sont les fonctions composantes de φ . Étant donné que ξ_0 n'est pas un point singulier, il existe une constante strictement positive c_1 dépendant de φ telle que :

$$\left(\sum_{j=1}^{j=n} \left| \int_0^1 \varphi'_j(tz_{k+1} + (1-t)z_k) dt \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \geq c_1.$$

Donc on a

$$V_\sigma(\gamma) \geq c_1 |z_p - z_0| = c_1 |\hat{z}_2 - \hat{z}_1|, \quad \forall \sigma \in \mathfrak{S}_{[0, 1]}, \quad \forall \gamma \in CVB^{(\varphi(\hat{z}_1), \varphi(\hat{z}_2))}([0, 1], \tilde{A}).$$

Il en résulte que

$$d(\varphi(\hat{z}_1), \varphi(\hat{z}_2)) \geq c_1 |\hat{z}_1 - \hat{z}_2|.$$

Pour l'autre inégalité, il suffit de voir, par définition de la métrique $d(\cdot, \cdot)$, que l'on a

$$d(\varphi(\hat{z}_1), \varphi(\hat{z}_2)) \leq \int_0^1 \left\| \frac{d}{dt} \varphi(t\hat{z}_1 + (1-t)\hat{z}_2) \right\|_2 dt \leq c_2 |\hat{z}_1 - \hat{z}_2|,$$

car ξ_0 est un point régulier de $\tilde{A}$, d'où l'inégalité (9). Montrons maintenant l'estimation (10). Supposons que ξ_0 est dans $\tilde{A}_{sing}$. On peut supposer sans

perdre de généralité que $\xi_0 = 0$. Soit φ la paramétrisation de Puiseux telle que $\varphi : \overline{D(0,1)} \rightarrow U \subset \tilde{A}$ et $z \mapsto (cz^k, \psi_2(z), \dots, \psi_n(z))$, où U est un ouvert de $\tilde{A}$, tel que $U \cap \tilde{A}_{sing} = \{0\}$ et $k_l(0) > k$, avec $k_l(0) = \text{ord}_0(\psi_l)$ ($\text{ord}_0(\psi_l)$ est l'ordre en 0 de ψ_l , $l \in \{2, \dots, n\}$). Nous allons commencer par montrer l'estimation suivante

$$\|\varphi(z)\|_2 \geq c_\varphi |z|^k, \quad \forall z \in D(0, \rho),$$

où c_φ est une constante réelle strictement positive ne dépendant que de φ , la constante ρ est fixée dans $]0, 1[$ dépendant de φ . On peut supposer que φ est holomorphe dans $\overline{D(0,1)}$, on peut donc développer les fonctions composantes φ_l en série entière dans $\overline{D(0,1)}$ en 0,

$$\psi_l(z) = \sum_{j=k_l(0)}^{\infty} \frac{1}{j!} \frac{\partial^j}{\partial z^j} \psi_l(0) z^j,$$

on obtient en factorisant par $z^{k_l(0)}$ et les inégalités triangulaires :

$$|\psi_l(z)| \geq |z^{k_l(0)}| \left(\frac{1}{k_l(0)!} \left| \frac{\partial^{k_l(0)}}{\partial z^{k_l(0)}} \psi_l(0) \right| - \left| \sum_{j=k_l(0)+1}^{\infty} \frac{\partial^j}{\partial z^j} \psi_l(0) z^j \right| \right),$$

$\forall z \in D(0, 1)$. Avec les inégalités de Cauchy :

$$\left| \sum_{j=k_l(0)+1}^{\infty} \frac{\partial^j}{\partial z^j} \psi_l(0) z^j \right| \leq \sum_{j=k_l(0)+1}^{\infty} \rho^{j-k_l(0)} \|\psi_l\|_{D(0,1)}, \quad \forall z \in D(0, \rho).$$

La constante ρ est dans l'intervalle $]0, 1[$. On a donc l'estimation ci-dessous

$$\left| \sum_{j=k_l(0)+1}^{\infty} \frac{\partial^j}{\partial z^j} \psi_l(0) z^j \right| \leq \|\psi_l\|_{D(0,1)} \frac{\rho}{1-\rho}.$$

Si maintenant, nous faisons tendre $\rho \rightarrow 0$ le membre de gauche tend à son tour vers 0, il existe donc $\rho_l \in]0, 1[$, tel que

$$\left| \sum_{j=k_l(0)+1}^{\infty} \frac{\partial^j}{\partial z^j} \psi_l(0) z^j \right| \leq \frac{1}{2k_l(0)!} \left| \frac{\partial^{k_l(0)}}{\partial z^{k_l(0)}} \psi_l(0) \right|, \quad \forall z \in D(0, \rho_l).$$

Nous obtenons l'inégalité suivante

$$|\psi_l(z)| \geq |z|^{k_l(0)} \frac{1}{2k_l(0)!} \left| \frac{\partial^{k_l(0)}}{\partial z^{k_l(0)}} \psi_l(0) \right|, \quad \forall l \in \{1, \dots, n\}, \quad \forall z \in D(0, \rho),$$

où $\rho = \min_{1 \leq l \leq n}(\rho_l)$ assez petit. Il s'en suit

$$\sqrt{|cz^k|^2 + |\psi_2(z)|^2 + \dots + |\psi_n(z)|^2} \geq c|z|^k, \quad \forall z \in D(0, \rho). \quad (11)$$

Fixons $\hat{z}_1$ dans $D(0, 1)$. Soit maintenant, γ un chemin de $CVB^{(0, \varphi(\hat{z}_1))}([0, 1], \tilde{A})$. Choisissons $\sigma = (t_0, \dots, t_p)$ une subdivision dans $\mathfrak{S}_{[0, 1]}$. Par construction de la paramétrisation de Puiseux, voire le paragraphe 3.4 et en particulier la proposition 2, il existe $z_0, \dots, z_p$ dans $D(0, 1)$, tels que $\varphi(z_j) = \gamma(t_j)$, pour tout j dans $\{0, \dots, p\}$ avec $|z_j| < |z_{j+1}|$ et $z_p = \hat{z}_1$.

$$V_\sigma(\gamma) = \sum_{j=0}^{j=p-1} \|\varphi(z_{j+1}) - \varphi(z_j)\|_2.$$

On peut trouver une subdivision σ_0 de $\mathfrak{S}_{[0, 1]}$ plus fine que σ de sorte que z_1 soit dans $D(0, \rho)$. Donc d'après l'estimation (11) on a

$$V_{\sigma_0}(\gamma) \geq c|z_1|^k + \sum_{j=1}^{j=p-1} \|\varphi(z_{j+1}) - \varphi(z_j)\|_2. \quad (12)$$

Rappelons que $z_0 = 0$. Il nous reste à minorer les termes de la somme. Nous avons

$$\varphi(z_{j+1}) - \varphi(z_j) = \int_0^1 \frac{d}{dt} \varphi(tz_{j+1} + (1-t)z_j) dt, \quad \forall j \in \{1, \dots, p-1\},$$

d'où

$$\|\varphi(z_{j+1}) - \varphi(z_j)\|_2 = |z_{j+1} - z_j| \left(\sum_{l=1}^{l=n} \left| \int_0^1 \varphi'_l(tz_{j+1} + (1-t)z_j) dt \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

où les φ_l sont les fonctions composantes de φ , donc

$$\|\varphi(z_{j+1}) - \varphi(z_j)\|_2 \geq |z_{j+1} - z_j| \left| \int_0^1 k(tz_{j+1} + (1-t)z_j)^{k-1} dt \right|.$$

En conclusion,

$$\|\varphi(z_{j+1}) - \varphi(z_j)\|_2 \geq |(z_{j+1})^k - (z_j)^k| \geq |z_{j+1}|^k - |z_j|^k, \quad \forall j \in \{1, \dots, p-1\},$$

car $|z_j| < |z_{j+1}|$, $\forall j \in \{0, \dots, p-1\}$. En reportant l'inégalité ci-dessus dans l'estimation (12), on obtient

$$V_{\sigma_0}(\gamma) \geq \min(c, 1) |z_p|^k = \min(c, 1) |\hat{z}_1|^k.$$

L'inégalité ci-dessus est encore vraie pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_{[0,1]}$, $\sigma \succcurlyeq \sigma_0$; d'où

$$V(\gamma) \geq \min(c, 1) |\hat{z}_1|^k.$$

Nous pouvons conclure

$$d(0, \varphi(\hat{z}_1)) \geq c_1 |\hat{z}_1|^k, \quad c_1 = \min(c, 1).$$

En ce qui concerne l'autre inégalité, il suffit de remarquer que nous avons,

$$d(0, \varphi(\hat{z}_1)) \leq \int_0^1 \left\| \frac{d}{dt} \varphi(t\hat{z}_1) \right\|_2 dt,$$

et ceci par la construction même de la métrique d . Par un calcul similaire aux précédents, nous déduisons que

$$\int_0^1 \left\| \frac{d}{dt} \varphi(t\hat{z}_1) \right\|_2 dt \leq c_2 |\hat{z}_1|^k,$$

où c_2 est une constante ne dépendant que de φ . ■

Nous allons démontrer maintenant que la fonction extrémale $V_{A \cap B(x_0, c_1 \varepsilon^k)}$ vérifie la propriété d'*HCP* dans $\tilde{A}$ muni de la métrique des géodésiques définie dans ce paragraphe.

Proposition 6 *Soit A une courbe algébrique réelle localement irréductible muni de $d(\cdot, \cdot)$ la métrique des géodésiques dans $\tilde{A}$. Alors, la fonction extrémale vérifie la propriété de continuité de Hölder locale dans $\tilde{A}$, pour la métrique $d(\cdot, \cdot)$. Plus précisément, il existe $\varepsilon_0, \mu_0 \in]0, 1[$ (dépendant de x_0) tel que $\forall \varepsilon \in]0, \varepsilon_0[, \forall \mu \in]0, \mu_0[$:*

• Si $x_0 \in A_{\text{sing}}$,

$$V_{A \cap B(x_0, c_1 \varepsilon^k)}(\xi) \leq C(x_0) \mu^{\frac{1}{2k}}, \quad \forall \xi \in B_{\tilde{A}}(x_0, \varepsilon^k \mu) \quad (13)$$

où k est la multiplicité complexe du point singulier x_0 dans $\tilde{A}$.

• Si $x_0 \in A_{\text{reg}} \cap \partial A$,

$$V_{A \cap B(x_0, c_1 \varepsilon)}(\xi) \leq C(x_0) \mu^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi \in B_{\tilde{A}}(x_0, \varepsilon \mu). \quad (14)$$

• Si $x_0 \in A_{\text{reg}} \setminus \partial A$,

$$V_{A \cap B(x_0, c_1 \varepsilon)}(\xi) \leq C(x_0) \mu, \quad \forall \xi \in B_{\tilde{A}}(x_0, \varepsilon \mu). \quad (15)$$

Avec $B_{\tilde{A}}(x_0, r) := \left\{ \xi \in \tilde{A} : d(x_0, \xi) < r \right\}$, r est un réel strictement positif et $C(x_0)$ une constante strictement positive localement supérieurement majorée.

Preuve : Commençons par démontrer (13). Comme nous l'avons fait dans les démonstrations précédentes, nous pouvons supposer, sans perdre de généralité, que $x_0 = 0$. D'après la proposition 5 du 4.2, modulo un changement de coordonnées unitaire, il existe des constantes ρ , ε_0 et c_1 , réelles, strictement positives et dépendant seulement de la paramétrisation locale φ . Cette paramétrisation est la paramétrisation de Puiseux construite dans la proposition 2 du 3.4 ; rappelons que nous avons $\rho > \varepsilon_0 > \varepsilon > 0$.

Soit $\xi \in B_{\tilde{A}}(x_0, \varepsilon^k \mu)$, d'après le (10) du lemme 5 du 4.3, l'inégalité suivante est vérifiée, $|\hat{z}|^k \leq \frac{\varepsilon^k \mu}{c_1}$, où $\varphi(\hat{z}) = \xi$. Maintenant, en utilisant le (5) de la proposition 5 du 4.2, on peut écrire $\forall \varepsilon \in]0, \varepsilon_0], \forall \theta \in \left\{ \frac{2k_j^\sigma \pi}{k} : j \in \{1, \dots, r_A^\sigma\} \right\}$,

$$V_{A \cap B(0, \tilde{c}_1 \varepsilon^k)} \circ \varphi(z) \leq \tilde{c}_2 V_{\varepsilon \mathcal{R}^{< r_A^\sigma >}}(z) \leq \tilde{c}_2 V_{\varepsilon I}(e^{-i\theta} z), \quad \forall z \in D(0, \rho) \quad (\square_1),$$

où $\sigma \in \{+, -\}$ et $0 < \varepsilon_0 < \rho$. Choisissons $0 < \mu_0 < c_1$ de sorte que $\forall \mu \in]0, \mu_0]$ implique $\frac{\mu}{c_1} < \rho^k$, donc $\left(\frac{|\hat{z}|}{\varepsilon}\right)^k < \frac{\mu}{c_1} < \rho^k$. Avec l'inégalité $(\square_1)$ et du fait que l'on puisse utiliser le lemme 3 du 4.2, car on a choisit μ_0 de sorte que $\frac{\mu_0}{c_1} < 1$ nous déduisons :

$$V_{A \cap B(0, \tilde{c}_1 \varepsilon^k)}(\xi) \leq \tilde{c}_2 V_I \left(e^{-i\theta} \frac{\hat{z}}{\varepsilon} \right) \leq C \mu^{\frac{1}{2k}}.$$

Pour démontrer (14) la technique de démonstration est identique, en effet soit $\xi \in B_{\tilde{A}}(0, \varepsilon \mu)$, il existe $\hat{z} \in D(0, 1)$ tel que $\varphi(\hat{z}) = \xi$. D'après le (9) du lemme 5 on a $d(0, \xi) \geq c_1 |\hat{z}|$, d'où $|\hat{z}| \leq \frac{\varepsilon \mu}{c_1}$. On conclut avec le lemme 4 du 4.2,

$$V_{A \cap B(0, \tilde{c}_1 \varepsilon)}(\xi) \leq \tilde{c}_2 V_{\varepsilon I}(\hat{z}) \leq C \mu^{\frac{1}{2}}.$$

L'Estimation (15) est semblable à la (13). ■

5 Démonstration des théorèmes

Nous allons démontrer les théorèmes 1 et 2 qui font l'objet de notre papier. Pour ce faire, nous commencerons par démontrer le lemme suivant.

Lemme 6 *Soit $\varphi : D(0, r) \longrightarrow \mathbb{C}^n$ une application holomorphe définie dans le disque ouvert $D(0, r)$ de $\mathbb{C}$ ($r > 0$) telle que $\varphi(0) = 0$. Notons $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ et $k = \min_{1 \leq j \leq n}(\text{ord}_0(\varphi_j))$. Alors il existe un réel strictement positif r_0 dépend uniquement de l'application φ , tel que : $\forall p \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$, $\forall r \in]0, r_0[, \forall z \in D(0, \frac{r_0}{2})$,*

$$\frac{\left| \frac{\partial}{\partial z}(p \circ \varphi)(z) \right|}{\sqrt{\sum_{1 \leq j \leq n} |\varphi'_j(z)|^2}} \leq \frac{c}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left| z + \frac{r}{2} e^{i\theta} \right|^{k-1}} \times \frac{\|p \circ \varphi\|_{D(0, r_0)}}{r}. \quad (16)$$

Preuve : Les fonctions composantes de φ se développent en série entière car φ est holomorphe, donc : $\forall l \in \{1, \dots, n\}$,

$$\varphi_l(\xi) = \sum_{k_l \leq j} a_{l,j} \xi^j, \quad k_l = \text{ord}_0(\varphi_l), \quad k_l \geq 1$$

Comme $a_{l,k_l} \neq 0$ lorsque $z \rightarrow 0$, il existe $r_l \in]0, 1[$ tel que :

$$|\varphi_l(\xi)| \geq c_{\varphi,l} |\xi|^{k_l-1}, \quad \forall \xi \in D(0, r_l),$$

d'où

$$\|\varphi'(\xi)\|_2 \geq c_\varphi |\xi|^{k-1}, \quad \forall \xi \in D(0, r_0), \quad r_0 = \min_{1 \leq l \leq n} (r_l), \quad k = \min_{1 \leq j \leq n} (k_l).$$

Majorons $\left| \frac{1}{z^{k-1}} \frac{\partial}{\partial z} (p \circ \varphi) \right|$. Il est aisé de voir que la singularité en 0 est artificielle. Donc $\frac{1}{z^{k-1}} \frac{\partial}{\partial z} (p \circ \varphi)$ est holomorphe dans $D(0, r_0)$. Nous pouvons appliquer successivement la formule intégrale de Cauchy à $\frac{1}{z^{k-1}} \frac{\partial}{\partial z} (p \circ \varphi)$, afin d'obtenir les inégalités voulues.

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^{k-1}} \frac{\partial}{\partial z} (p \circ \varphi)(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z, \frac{r}{2})} \frac{1}{\zeta^{k-1}} \frac{1}{2\pi i} \int_{C(\zeta, \frac{r}{2})} \frac{p \circ \varphi(\xi)}{(\zeta - \xi)^2} d\xi \frac{d\zeta}{\zeta - z} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{1}{(z + \frac{r}{2} e^{i\theta_2})^{k-1}} \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{p \circ \varphi(z + \frac{r}{2} e^{i\theta_2} + \frac{r}{2} e^{i\theta_1})}{\frac{r}{2} e^{i\theta_1}} d\theta_1 d\theta_2, \\ &\quad \forall r \in]0, r_0[, \quad \forall z \in D(0, \frac{r}{2}). \end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{z^{k-1}} \frac{\partial}{\partial z} p \circ \varphi(z) \right| &\leq \frac{c}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{|z + \frac{r}{2} e^{i\theta}|^{k-1}} \frac{\|p \circ \varphi\|_{D(z, r_0)}}{r} d\theta, \\ &\quad \forall r \in]0, r_0[, \quad \forall z \in D(0, \frac{r}{2}). \end{aligned}$$

D'où l'estimation (16). ■

Commençons par démontrer 1. du théorème 1.

Preuve : Sans perdre de généralité, nous pouvons supposer que $x_0 = 0$ et que $0 \in A_{\text{sing}}$.

Soit p un polynôme dans $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ fixé. Si $v \in C(A, 0)$ est un vecteur tangent unitaire, alors la branche de A tangente à v est paramétrisée par $\varphi|_{\mathcal{R}^{<r_A^+>}}$ ou $\varphi|_{\mathcal{R}^{<r_A^->}}$ (φ paramétrisation de Puiseux), ceci d'après la proposition 2 du 3.4. On peut donc choisir l un entier dans $\{0, \dots, k-1\}$, tel que le segment $[0, e^{i\frac{2l\pi}{k}}] \subset \mathcal{R}^{<r_A^+>} \cup \mathcal{R}^{<r_A^->}$ et $\varphi|_{[0, e^{i\frac{2l\pi}{k}}]}$ paramétrise la branche de

A à laquelle le vecteur v est tangent. Pour des commodités d'écriture et de calculs, nous ne changerons rien au résultat voulu, si nous transformons le segment $[0, e^{i\frac{2l\pi}{k}}]$ en $[0, 1]$, par une rotation dans $\mathbb{C}$ d'angle $-\frac{2l\pi}{k}$ (bien évidemment $\mathbb{C}$ est orienté dans le sens direct). L'ensemble $\mathcal{R}^{<r_A^+>} \cup \mathcal{R}^{<r_A^->}$ n'est en rien modifié par cette rotation.

D'après l'inégalité (16) lemme 6 :

$$|D_v p(0)| \leq \frac{c}{r^k} \|p \circ \varphi\|_{D(0,r)}, \quad \forall r \in]0, r_0], \quad (17)$$

la constante r_0 est réelle strictement positive ne dépendant que de φ . D'après le (13) la proposition 6, il existe $\mu_0, \varepsilon_0 > 0$ tel que : $\forall \xi \in \tilde{A}, d(\xi, 0) \leq \varepsilon^k \mu$,

$$V_{A \cap B(x_0, c_1 \varepsilon^k)}(\xi) \leq C(x_0) \mu^{\frac{1}{2k}} \quad (\square_1)$$

Quitte à diminuer la valeur de μ_0 , on peut donc écrire :

$$|D_v p(0)| \leq \frac{c}{(\varepsilon \mu)^k} \|p \circ \varphi\|_{D(0, \varepsilon \mu)}, \quad \forall \mu \in]0, \mu_0[, \quad \forall \varepsilon \in]0, \varepsilon_0[.$$

Estimons $\|p \circ \varphi\|_{D(0, \varepsilon \mu)}$; c'est du (10) du lemme 5 du 4.3 dont nous obtenons l'estimation ci-dessous,

$$\|p \circ \varphi\|_{D(0, \varepsilon \mu)} \leq \|p\|_{B_{\tilde{A}}(0, c_2(\varepsilon \mu)^k)}, \quad \forall \mu \in]0, \mu_0[, \quad \forall \varepsilon \in]0, \varepsilon_0[, \quad (18)$$

(car $\varphi(D(0, \varepsilon \mu)) \subset B_{\tilde{A}}(0, c_2(\varepsilon \mu)^k)$).

$$|D_v p(0)| \leq \frac{c}{(\varepsilon \mu)^k} \|p\|_{B_{\tilde{A}}(0, c_2(\varepsilon \mu)^k)}, \quad \forall \mu \in]0, \mu_0[, \quad \forall \varepsilon \in]0, \varepsilon_0[.$$

avec inégalité de Bernstein-Walsh :

$$|D_v p(0)| \leq \frac{c}{(\varepsilon \mu)^k} \|p\|_{A \cap B(0, c_1 \varepsilon^k)} \exp \left(\deg(p) \sup_{B_{\tilde{A}}(0, c_2(\varepsilon \mu)^k)} V_{A \cap B(0, c_1 \varepsilon^k)} \right).$$

En utilisant la propriété d'*HCP* de la fonction de Green ($\square_1$), on obtient : $\forall \mu \in]0, \mu_0[, \quad \forall \varepsilon \in]0, \varepsilon_0[$,

$$|D_v p(0)| \leq \frac{c}{(\varepsilon \mu)^k} \|p\|_{A \cap B(0, c_1 \varepsilon^k)} \exp \left(C_3 \deg(p) (\mu^k)^{\frac{1}{2k}} \right),$$

d'où

$$|D_v p(0)| \leq \frac{c}{(\varepsilon \mu)^k} \|p\|_{A \cap B(0, c_1 \varepsilon^k)} \exp \left(C_3 \deg(p) \mu^{\frac{1}{2}} \right).$$

En posant $\mu = \frac{\tilde{C}}{(\deg p)^2}$, avec $0 < \tilde{C} < \mu_0$

$$|D_v p(0)| \leq c e^{C_3 \sqrt{\tilde{C}}} \left(\frac{\tilde{C}(\deg(p))^2}{\varepsilon} \right)^k \|p\|_{A \cap B(0, c_1 \varepsilon^k)}.$$

Le (1) du théorème 1 est donc montré.

Pour démontrer 2. et 3. du théorème 1, la démonstration techniquement identique, seulement il faut utiliser le (14) et (15) de la proposition 6, le (9) et (20) du lemme 5 et le lemme 4. ■

Un exemple intéressant a été démontré par L.Bos [7] d'inégalités de Markov tangentielles sur certaines courbes algébriques de $\mathbb{R}^2$. Il montre que l'exposant k est optimum sur les courbes de type :

$$\Gamma = \{(t^p, t^q) : t \in [0, 1]\},$$

où p et q sont deux entiers naturels premiers entre eux, tels que $p < q$. Pour des inégalités globales, il montre que k ne peut être plus petit que p . Or cet entier k est aussi la multiplicité complexe du point $(0, 0)$ de la courbe algébrique complexifiée $\tilde{\Gamma}$ de Γ , sans oublier que tous les autres points de Γ sont des points réguliers, donc localement ont un exposant de Markov au moins égal à 1 ou p . Le théorème 1 conforte l'idée que la multiplicité des points d'une courbe algébrique joue un rôle sur l'exposant de Markov, on peut même penser que les points singuliers d'une courbe algébrique réelle se comportent comme un bord, ce qui expliquerait l'apparition du $2k$ à l'exposant.

L'auteur remercie chaleureusement M. Baran, J. Duval, L. Bos, N. Levenberg et A. Zeriahi pour les entretiens fructueux et intéressants qui ont permis d'achever ce travail.

Références

- [1] A.BRUDNYI. Bernstein-type inequality for algebraic functions.
- [2] A.SADULLAEV. An estimate for polynomials on analytic sets. *Math. USSR. Izv.* 20 :175–211, 1983.
- [3] A.ZERIAHI. *Inégalités de Markov et développement en série de polynômes de fonctions C^∞ et $\mathcal{A}^\infty$* . Proceeding of special year of complex analysis of Mittag-Leffler institute. Princeton univ. press, princeton new jersey edition 1993 edition, 1987-1988.

- [4] E.M.CHIRKA. *Complex analytic sets*, volume 46. Kluwer academic publishers edition, 1985.
- [5] G.LORENTZ. *Approximation of function*. Holt. reinhart and winston edition, edition, 1966.
- [6] J.SICIAK. Extremal plurisousharmonic function in $\mathbb{C}^n$. *Annales Polonici. Mathematici*, 39 :175–211.
- [7] L.BOS. An instructive example. Exposé au groupe de travail de pluripotentiel de Toulouse, 1996.
- [8] L.BOS and P.MILMAN. Sobolev-gagliano-nirenberg and markov type inequalities on subanalytic domains. Preprint, 1995.
- [9] M.BARAN. Bernstein type theorem for compact sets in $\mathbb{R}^n$. *J.Apprx.Theory*, 79(2) :190–198, 1994.
- [10] M.BARAN. Markov inequalities wth polynomial parametrisation. *Ann.Polon.Math*, 60(1) :69–79, 1994.
- [11] M.BARAN and W.PLESNIACK. Bernstein and van der corput and types inequalities. *Jaggielloonian University of Cracow. Institute of Mathematics*, 1996. Preprint.
- [12] M.KLIMEK. *Pluripotential theory*, volume 6 of *Monographies New Series*. London Mathematic Society, oxford science puplications edition, 1991.
- [13] P.GOETGHELUCK. Inegalité de markov sur les ensembles effilés. *J.Apprx.Theory*, 30 :149–154, 1980.
- [14] P.MILMAN, L.BOS, N.LEVENBERG, and B.A.TAYLOR. Tangentiel markov inequalities characterize submanifolds of $\mathbb{R}^n$. *Indiana.Univ.J*.
- [15] R.NARASIMAHN. *Introduction to theory of analytic space*, volume 25 of *Lecture note in matimatics*. Springer verlag edition, 1966.
- [16] R.NARASIMHAN and C.FEFFERMAN. A local inequality on real algebraic varieties. *Math.Z*, 223 :673–692, 1996.
- [17] S.ŁOJASIEWICZ. *Introduction to complex analytic geometry*. Birkhäuser edition, 1991.
- [18] W.PAWLUCKI and W.PLESNIAK. Markov’s inequalities and $\mathcal{C}^\infty$ function on sets polynomial cusps. *Math. Ann*, 275 :467–211, 1986.
- [19] W.PAWLUCKI and W.PLESNIAK. Extension of $\mathcal{C}^\infty$ from sets with polynomial cusp. *Studia Math*, 88 :279–287, 1988.

Adresse :
Laboratoire E.Picard,

U.M.R. C.N.R.S. 5580,
Département de Mathématiques,
Université Paul Sabatier
118, route de Narbonne 31062
TOULOUSE CEDEX 04
FRANCE.
Mail :`gendre@picard.ups-tlse.fr`